

ASSOCIAÇÃO DE ESPIRAMICINA COM METRONIDAZOL

DESCRIÇÃO

A associação da espiramicina, antibiótico macrolídeo predominantemente bacteriostático contra Gram-negativos e microplasmas, com o metronidazol, anti-infeccioso da série dos nitroimidazóis, é comumente utilizado como coadjuvante em cirurgias periodontais, abscessos gengivais, estomatites, gengivites, glossites, piorréias, periodontites.

Esta associação atua sobre *Peptostreptococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Actionomyces spp*, *Bacteroides spp*, *Fusobacterium spp*, *Actinobacillus spp*, *Capnocytophaga spp*, *Spirochaeta*, *Clostridium spp*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, *Balantidium coli*.

RECOMENDAÇÕES

O tratamento deve ser acompanhado de remoção de tártaro e meticulosa limpeza oral efetuada pelo médico veterinário.

EFEITOS ADVERSOS

Pode haver casos isolados de intolerância a espiramicina, ocasionando vômitos. Nesse caso, suspender o medicamento.

DOSES P/ CÃES E GATOS

Espiramicina: 75.000UI/kg	} 1 vez ao dia por 5-10 dias/VO
Metronidazol: 12,5mg/kg	

Referências

1. Viana, F. A. B. Guia Terapêutico Veterinário – Lagoa Santa: Gráfica e Editora CEM, 2007
2. Spinosa, Helenice de Souza Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária – 4.ed. – Rio de Janeiro : Guanabara Koogan.2006
3. Bula Periodontil
4. Bula Stomorgyl

Ana Paula Pinheiro Pereira – CRF-RS 12137
Farmacêutica Responsável

Rua Barão de Santa Tecla, 774
Pelotas – RS
Fone: (53) 3222.0016
e-mail: contato@vetpharma.far.br

